

Složení:
 Zinek (Zn) - min. 8,5 hmot. %
 ve vodě rozpustného zinku (Zn).
 Zinek obsažen ve formě komplexů
 acetáto – uroniového typu.
 Čistá hmotnost: 6,45 kg



HNOJIVO ES

Zinek - roztokové hnojivo

Výrobce:
 ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.
 Melantrichova 477/20, 110 00 Praha 1
 Česká republika

Zinetic

Organický komplex se zinkem



Zinetic je ve smyslu Nařízení č. 2003/2003 Evropského parlamentu a Rady týkajícího se hnojiv typovým hnojivem ES, přičemž splňuje kvalitativní znaky pro typ: **E.1.7.e.**

Hnojivo navíc obsahuje: DMSO // Kyselina butandiová // Kyselina o-hydroxybenzoová. Zinetic je hnojivo nové generace vyznačující se efektivním vnosem zinku do porostů kulturních plodin. Kromě řešení deficitu zinku v rostlinných pletivech Zinetic pozitivně ovlivňuje zakořeňování, růst a vývoj rostlin. Zinetic dodává rostlinám zinek v efektivně přijatelné formě, čímž napomáhá ke správnému řízení mnoha metabolických pochodů (metabolismus cukrů, aminokyselin, bílkovin a růstových látek).

Údaje v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 CLP:

Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Okamžitě volejte lékaře poskytujícího první pomoc. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečných odpadů v obci.

Obsahuje: Octan zinečnatý.

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Hnojivo se dodává balené. **Velikost balení: 5 litrů**

Před použitím důkladně protřepat!

Případná sedimentace nesnižuje účinnost přípravku.

Datum výroby / Číslo výrobní šarže / Expirace: uvedeno na obale

Hnojivo se používá pro foliární aplikace.

Plodina	Optimální dávka (l/ha)	Nejvhodnější termín aplikace
řepka	0,8	3 až 5 pravých listů
kukuřice	0,8 – 1,2	3 až 6 pravých listů
mák	0,8	6 až 8 pravých listů
slunečnice	0,8	4 až 8 pravých listů
cukrovka	0,8	3 až 6 pravých listů
obiloviny	0,8	3. list až plně odnožování
ostatní	0,8	Při nedostatku zinku v době aktivního růstu

Aplikujte nejlépe v dávce 100 – 300 l/ha postřikové kapaliny. Bez konzultace se zástupci společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nepřekračujte ani nesnižujte optimální dávkování. Hnojivo Zinetic se skladuje v původních, dobře uzavřených obalech, v suchých skladech, odděleně od potravin a krmiv, při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před nepoučenými osobami a dětmi, před přímým slunečním svitem a sálavým teplem.



Nebezpečí.