

# Lector<sup>®</sup>Max

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení jednole-  
tých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém ozimém  
a jarním, žitě ozimém a tritikale ozimém.

**Profesionální uživatel.**

**Název a množství účinné látky:** florasulam 200 g/kg (20% hmot.)  
tribenuron-methyl 600 g/kg (60% hmot.)

**Označení přípravku:**

- H410 **Velice toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.**  
P273 **Zabraňte uvolnění do životního prostředí.**  
P280 **Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít.**  
P391 **Uniklý produkt seberte.**  
P501 **Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.**  
EUH208 **Obsahuje tribenuron-methyl. Může vyvolat alergickou reakci.**  
EUH401 **Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.**  
SP 1 **Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).**



GHS09

## 250 g

51000xxx\_112020/CZ/Book



Distributor v ČR: ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.,  
Melantrichova 477/20, 110 00 Praha 1, Česká republika

### PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití

#### Držitel povolení/Právní zástupce:

Nufarm GmbH & Co KG,  
St.-Peter-Strasse 25,  
A 4021, Linz, Rakousko,  
tel.: +43 70 6918-0

#### Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin:

Nufarm GmbH & Co KG,  
St.-Peter-Strasse 25,  
A 4021, Linz, Rakousko

#### Evidenční číslo přípravku:

**5160-3**

#### Číslo šarže:

uvedeno na obalu

#### Datum výroby formulace:

uvedeno na obalu

#### Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby; skladovací  
teplota +5 °C až +30 °C

#### Množství přípravku v obalu:

250g

**Nufarm**  
Grow a better tomorrow

#### Způsob působení:

Přípravek Lector Max obsahuje účinné látky tribenuron-methyl (sulfonylmočovina) a florasulam (triazolopyrimidin), obě pak patří do skupiny tzv. ALS inhibitorů, látek inhibujících aktivitu klíčového enzymu acetolaktát syntázy. Tato inhibice se projevuje zástavou buněčného dělení v meristematických pletivech, omezeným transportem asimilátů floémem a následně zastavením růstu. Obě účinné látky jsou po aplikaci rychle vstřebávány listy a omezenou dobu i kořeny. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevle přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození (chlorózy a nekrózy na horních listech, postupně zavadnutí a vyschnutí plevlů) se projeví za optimálních podmínek do 10 dní po aplikaci, max. do 2 týdnů.

#### Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	3) Dávkování, misitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k SO 3) k OL	4) pozn. k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý	plevele dvouleté jednoleté	25 g/ha	AT	1) od 13 BBCH, do: 39 BBCH na jaře	
pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní	plevele dvouleté jednoleté	25 g/ha	AT	1) od 13 BBCH, do: 32 BBCH	

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito	200-300 l/ha	postřik	1x

#### Upřesnění použití:

Spektrum účinnosti:

Plevle citlivé – heřmánkovec přímořský, hořčice rolní, chrpa modrá, kokoška pastušá tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, merlík bílý, opletka obecná, penizek rolní, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesno ptačí, svizek přítula, výdrol řepky Plevle méně citlivé – hluchavka nachová, rozrazil břechtanolistý, rozrazil perský, violka rolní

Růstová fáze plevlů v době aplikace:

Aplikujte co nejdříve na jaře, za příznivých podmínek pro růst plevlů, optimálně ve fázi plevlů BBCH 10-16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých listů.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Náhradní plodiny

V případě likvidace ošetřeného porostu je možné po orbě zařadit jako náhradní plodinu pouze obilninu.

V kalendářním roce, ve kterém byla provedena aplikace, je možno po sklizni zařadit obilniny, řepku olejku a bob. Za nepříznivých podmínek pro odbourávání přípravku (sucho, zásadité půdy) může dojít k poškození řepky olejky.

Pěstování následných plodin v následujícím kalendářním roce je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi ALS inhibitorů na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

**Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:**

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, žito jarní, tritikale ozimé, oves ozimý, oves jarní	4	4	4	4
ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, žito jarní, tritikale ozimé, oves ozimý, oves jarní	NELZE	30	15	5

**Další omezení:**

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

**Příprava aplikační kapaliny:**

Uvedeno v bodu: **Další údaje a upřesnění.**

**Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:**

• Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení.

• Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně 10% objemu nádrže postřikovače) a propláchněte ramena a hadice. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení.

- Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou (případně přidejte odpovídající množství čisticího přípravku). Promíchejte a propláchněte ramena a hadice. Nádrž doplňte vodou a ponechte 15 minut stát za stálého míchání. Znovu propláchněte ramena a trysky a úplně vyprázdněte aplikační zařízení.
- Trysky a sítko čistěte odděleně.
- Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně 10% objemu nádrže postřikovače) a propláchněte ramena a hadice. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení.

**Osobní ochranné pracovní prostředky:**

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě, aplikaci a čištění aplikačního zařízení:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem dle přílohy A k ČSN EN ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje: není nutná

Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

**Informace o první pomoci:**

**Všeobecné pokyny:**

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

**První pomoc při nadychnání:** Expozice je nepravděpodobná.

**První pomoc při zasažení kůže:** Umyjte se vodou a mýdlem.

**První pomoc při zasažení očí:** Vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazený, a pokud je lze snadno vyjmout. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat.

**První pomoc při náhodném požití:** Vypláchněte ústa vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

**Skladování:**

Přípravek skladujte v uzavřených neporušených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách +5 °C až +30 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

**Likvidace obalů a zbytků:**

Zákaz opětovného použití obalu.

Zbytky postřikové kapaliny a oplachované vody se zředí v poměru cca 1:5 vodou a beze zbytku vystřikají na ošetřovanou plochu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojestupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po eventuálním nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

**Další údaje a upřesnění:**

K odměření příslušného množství přípravku použijte zelenou skládáči lepenkovou odměrku.

**Příprava aplikační kapaliny:**

Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem.

Držitel povolení a právní zástupce nepřebírají žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené nesprávným skladováním a použitím přípravku, případným mícháním nebo sekvenčním použitím s jinými přípravky jinak než v souladu s doporučeným použitím v této etiketě a v platném Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, taktéž ani za následky vyplývající z použití přípravku během anebo před vznikem mimořádných povětrnostních podmínek, a nebo při ošetření odrůd, o kterých není držitelé rozhodnutí o povolení/právním zástupci známo, že jsou mimořádně citlivé na poškození způsobené přípravkem.

Lector® je ochranná známka společnosti NUFARM GmbH & Co KG.

# Lector<sup>®</sup>Max

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení jednolepých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém ozimém a jarním, žitě ozimém a tritikale ozimém.

**Profesionální uživatel.**

**Název a množství účinné látky:** florasulam 200 g/kg (20% hmot.)  
tribenuron-methyl 600 g/kg (60% hmot.)

Označení přípravku:		<b>VAROVÁNÍ</b>	
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.		
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.		
P280	Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít.		
P391	Uniklý produkt seberte.		
P501	Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.		
EUH208	Obsahuje tribenuron-methyl. Může vyvolat alergickou reakci.		
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.		
SP 1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).		
			<b>GHS09</b>

## 250 g

51000xxxx\_112020/CZ/Book



Distributor v ČR: ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.,  
Melantrichova 477/20, 110 00 Praha 1, Česká republika

### PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití

#### Držitel povolení/Právní zástupce:

Nufarm GmbH & Co KG,  
St.-Peter-Strasse 25,  
A 4021, Linz, Rakousko,  
tel.: +43 70 6918-0

#### Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin:

Nufarm GmbH & Co KG,  
St.-Peter-Strasse 25,  
A 4021, Linz, Rakousko

#### Evidenční číslo přípravku:

**5160-3**

#### Číslo šarže:

uvedeno na obalu

#### Datum výroby formulace:

uvedeno na obalu

#### Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby; skladovací  
teplota +5 °C až +30 °C

#### Množství přípravku v obalu:

250g



**Nufarm**  
Grow a better tomorrow